

AFASIA	Área de la lesión (h.izquierdo)	Fenómenos asociados	Expresión	Comprensión	Repetición	Denominación
BROCA	Corteza motora inferior del lóbulo frontal y estructuras subcorticales adyacentes.	Hemiplejía derecha de predominio faciobraquial Apraxia unilateral izquierda (apraxia simpática).	No fluente Inicio: Muy reducido. Mutismo. Estereotipias. Evolución: anartria o agramatismo.	Buena en general. Déficit en forma de agramatismo receptivo.	Alterada	Alterada. Mejora con ayudas.
WERNICKE	Zona posterior y superior del lóbulo temporal.	1. Cuadrantanopsia superior derecha 2. Si lesión amplia y profunda: Hemianopsia homónima derecha.	Fluente. Articulación normal. Múltiples parafasias (neológicas, fonológicas, semánticas).	Muy alterada	Alterada. Parafasias Fonológicas.	Alterada.
CONDUCCIÓN	Fascículo arqueado. Parietal anterior e inferior profunda.	Hemihipoestesia derecha. Apraxia ideomotora. Apraxia facial.	Fluente. Parafasias fonémicas.	Buena.	Alterada.	Alterada. Mejora con ayudas.
GLOBAL	Amplia zona frontal, temporal, parietal y estructuras subcorticales adyacentes.	Hemiplejía derecha, Hemihipoestesia derecha. Hemianopsia homónima derecha. Si lesiones embólicas: posible ausencia de hemiparesia.	No fluente Muy reducido. Mutismo. Posible preservación del lenguaje automático.	Muy alterada.	Alterada.	Alterada.
MOTORA TRASCORTICAL	1. Lóbulo frontal por delante del área de Broca. 2. Área motora suplementaria. Sustancia blanca periventricular (desconexión zona de Broca).	1. Hemiparesia derecha de predominio braquial. 2. Hemiparesia derecha de predominio crural.	No fluente. Dificultad en el inicio. No realiza narración. Posible ecolalia.	Buena.	Preservada.	Alterada. En algunos casos preservada.
SENSORIAL TRASCORTICAL	Zona de intersección de los lóbulos temporal, parietal y occipital. Por detrás y por encima del área de Wernicke.	Cuadrantanopsia inferior derecha.	Fluente. Ecolalia posible.	Afectada.	Preservada.	Alterada.
TRASCORTICAL MIXTA	Suma de las lesiones de las afasias motora transcortical y sensorial transcortical. Deja libre la zona perisilviana, en general zona limítrofe de la irrigación de la arteria silviana.	Hemiplejía derecha. Hemihipoestesia derecha. Hemianopsia homónima derecha.	No fluente Limitada a repeticiones automáticas (ecolalia).	Muy afectada.	Preservada.	Alterada.
ANÓMICA	1. Porción inferior del lóbulo temporal. 2. Parietal inferior. 3. Forma residual de todas las afasias.	Variables en función de la topografía específica.	Fluente. Buena estructura gramatical. Déficit en la evocación de palabras. Posibles circunloquios y palabras ómnibus.	Buena.	Preservada.	Alterada.